

tête est très fortement ponctuée même entre les yeux, le pygidium marqué de quatre points blancs disposés en arc, les épisternes métathoraciques ponctués et pubescents tandis qu'ils sont (ainsi que la tête) lisses chez *postica*; les segments abdominaux 2-5 ont chacun un point blanc ovale au bord antérieur de chaque côté de leur milieu, les segments 1-4 chacun un mince trait blanc au bord postéro-externe; ils sont immaculés chez *postica*.

Ce que SCHAUM a écrit sur *P. postica*, *P. orphanulus* et *P. fimbriata* (*Ann. Soc. ent. Fr.* [1844], p. 385-386) est exact, mais cet auteur s'est trompé plus tard lorsqu'il a considéré *P. orphanulus* et *P. fimbriata* comme des variétés de *P. postica* (*Ann. Soc. ent. Fr.* [1849], p. 280). L'erreur qu'il a commise alors a été reproduite dans le « Catalogus Coleopterorum » de Gemminger et Harold (p. 1328).

L'*orphanulus* de VÖET est très probablement une variété de *P. marginata* DRURY. J'ai pu examiner, parmi les *Pachnoda* recueillis par M. MELOU, un *P. marginata* semblable à la figure de *P. orphanulus* donnée par HERBST (*Natursyst. der Käfer*, tab. 30, fig. 9).

---

**Description d'un nouveau *Prioninae* [COL. CERAMBYCIDAE]  
du Haut Yunnan**

par Aug. LAMEERE.

Notre collègue, M. P. GUERRY, de Roanne, a eu l'amabilité de me communiquer toute une série de *Prioninee* qu'il a reçus du Yunnan et parmi lesquels se trouvait un exemplaire mâle d'une espèce nouvelle de *Megopis*, provenant de la région de Yung-pai, au S.-E. de Tali :

***Megopis (Aegosoma) Guerryi*, n. sp.** — Ressemble beaucoup au *Megopis sinica sinica* White, mais doit constituer, dans le sous-genre *Aegosoma*, avec le *Megopis Pici* Laméeere, du même pays, une catégorie spéciale : les antennes du mâle sont, en effet, grêles comme dans le sous-genre *Bavalipton*; alors que chez le *Megopis Pici*, elles sont glabres avec le 1<sup>er</sup> article couvert de quelques poils, chez le *Megopis Guerryi* elles sont non pas ciliées en dessous, comme chez les *Bavalipton*, mais entièrement couvertes de poils courts et épais, sauf sur les derniers articles.

Les antennes dépassent un peu l'extrémité du corps, le 3<sup>e</sup> article dépassant le niveau de l'insertion des hanches intermédiaires; les cinq

premiers articles sont entièrement rugueux; le 6<sup>e</sup> est un peu âpre, porifère aux deux extrémités, avec la région médiane luisante; les suivants ne sont pas entièrement porifères, comme ils le sont chez *M. sinica*, mais luisants au milieu, leur surface étant plus ou moins irrégulière.

Les yeux ressemblent à ceux du *M. sinica*, mais leur lobe inférieur est un peu plus étroit, un peu plus allongé transversalement.

La tête est finement granuleuse avec quelques granules plus forts près des yeux; elle offre, comme le reste du corps, une pubescence d'un gris jaunâtre qui est faiblement condensée en quatre taches sur le pronotum; celui-ci est, comme chez *M. sinica*, un peu étranglé en avant, avec les angles postérieurs plus saillants. L'écusson est très pubescent; les élytres, dentés à l'angle sutural et régulièrement pubescents, sont très finement granuleux, avec quelques granules plus forts à la base; leurs côtes sont très faibles, les deux côtes internes étant réunies au quart postérieur et seules nettement distinctes à cause des quelques granules plus prononcés qui les couvrent. Les pattes sont semblables à celles du *M. sinica*.

La teinte est d'un brun foncé, un peu rougeâtre en dessous et sur les antennes; les élytres sont limbés de noirâtre.

La longueur est de 50 millimètres.

---

### Nouveaux Cérambycides [COL.] de la Chine méridionale II (1)

par Maurice Pic.

*Aeolesthes aurosignatus*, n. sp. — *Elongatus, nitidus, niger, superne et infra pro parte signaturis auris ornatus*.

Allongé, brillant, noir, en partie orné, en dessus et en dessous, de bandes ou de macules pubescentes dorées. Tête allongée, impressionnée ou sillonnée au milieu; antennes à peu près de la longueur du corps, à articles en partie pubescents de fauve, les 3<sup>e</sup> à 5<sup>e</sup> un peu épaissis au sommet; les suivants allongés et aplatis. Prothorax étroit et long, sinué et tuberculé sur les côtés, irrégulièrement plissé et ridé sur le disque, avec de petits plis transversaux sur la base, orné sur les côtés de macules allongées ou bandes pubescentes dorées. Élytres assez larges à la base, atténués à l'extrémité, subtronqués au sommet, ornés chacun de 4 lignes, plus ou moins longues, de pubescence

(1) Voir *Bulletin* [1915], p. 313.